

令和3年産 水稻栽培ごよみ (早 期 コシヒカリ・ひとめぼれ)

JAおおいた東部事業部

監修 大分県東部振興局
JA全農大分県本部

月	3月			4月			5月			6月			7月			8月		
	品種/旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		
生育ステージ	コシヒカリ			元肥 田植期				中干し		穂肥			出穂期			成熟期		
時期				田植前日						出穂前10日			出穂期			乳熟期		
病害虫名		種子消毒		いもち病 ウンカ類 コナメカイ						穂言いもち			カメムシ類 ウンカ			カメムシ類 ウンカ類 ヨコバイ いもち病 カメムシ類 ウンカ類		
農薬名 (粉剤体系)	塩水選	スミチオン乳 テクリードCフロアブル		防人箱粒剤						フジワラップ粒剤			ダブルカットスタークル粉剤DL スタークル粉剤DL					
農薬名 (粒剤体系)	塩水選	スミチオン乳 テクリードCフロアブル		防人箱粒剤						フジワラップ粒剤 または コラトップスタークル粒剤			スタークル粒剤					
散布量 (10a当り)		1000倍 200倍		1箱当り 500g						3~4kg			3~4kg 1kg			3kg		
注意事項	粉枯細菌等の予防のため、必ず実施する。	毒は必ず行う。 粉枯細菌病の多発のおそれがあるので種子消毒		葉いもち病予防のため必ず散布する						灌水状態を保ち散布する			穂揃い期まで					
基幹防除	(粉剤体系)	スミチオン乳 テクリードCフロアブル		防人箱粒剤		フジワラップ粒剤		ダブルカットスタークル粉剤DL		スタークル粉剤DL								
	(粒剤体系)	スミチオン乳 テクリードCフロアブル		防人箱粒剤		フジワラップ粒剤 または コラトップスタークル		スタークル粒剤										

○乾燥→水分は、14・5%→15・0%とし過乾燥にならない様に注意する。
○刈取→籾が80%程度黄化した時に刈取る。
○落水→早期落水は質を落とすので刈取前10日頃まで間断灌水を続ける。

除草剤の使い方

田植日数	初期除草剤使用禁止 (移植前6~1日)	田植	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
初期雑草処理	粒剤 パッチリLX ジャンボ フロアブル	パッチリLX (ノビエ2.5葉期まで)																		
中期雑草処理	レプラス1キロ粒剤	クログワイ・ホタルイ・オモダカ・水田一年生雑草(移植後14日~60日) 1kg/10a																		
	ワイドショット1キロ粒剤	マツバイ・ホタルイ・ウリカワ・水田一年生雑草(移植後15日~ノビエ4葉期但し、収穫45日前まで) 1kg/10a																		
	バサグラン粒 バサグラン液	水田一年生雑草・ホタルイ・ウリカワ 落水散布 (粒:移植後15~60日 但し収穫60日前まで 3~4kg/10a) (液:移植後15~55日 但し収穫50日前まで 500mlを100L/10a)																		

施肥基準(10a当り)

項目	土づくり	基肥	穂肥 出穂前18日
一般田		化成肥料10-16-16(30kg) 又は、12-18-14(30kg)	化成肥料16-0-16 (20kg)
砂質田	粒状ミネガード (10a当り80kg)	化成肥料10-16-16(40kg) 又は、12-18-14(30kg)	
		エムコート477(40kg)(90日)	不要

- ### 基本技術と増収のポイント
- 1株の植付本数を3~4本植とし田植後10日間は深水で管理する。
 - 田植後10日すぎ頃から断間灌水とし、遅くとも中干し前までに溝切りする。
 - 落水期まで断間灌水を行う。
 - 生育の前半は多少見劣りしても穂肥までは施肥しないこと。
 - 穂肥は幼穂が1cm位の時に施用する。
 - カメムシ防除の徹底。

倒伏防止策

※倒伏が心配される水田には、ビビフル粉、又は、ビビフルフロアブルを出穂10日~5日前までに散布する。

薬名	10aあたり使用薬量
ビビフル粉	4kg
ビビフルフロアブル	通常散布 薬量75ml~100ml/液量50L~150L 少量散布 薬量75ml~100ml/液量25L~50L

塩水選

(新しい卵で調べる)

種子消毒

※二剤混合を必ず行う 粉、1斗(10kg程度)

- ①スミチオン乳
- ②テクリードCフロアブル

③粉袋をよくゆすり、薬液が中心まで浸水するようにする。
④種子消毒の廃液は適切に処理すること。

作業メモ

土づくり	種子消毒	播種日	基肥施用	箱苗施薬日	田植	初期除草剤散布	中後期除草剤散布	病害虫防除	無人ヘリ散布	穂肥施用	出穂	稲刈
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日

JAおおいた東部事業部 経済企画課：0978-68-8680

国見配送センター 0978-82-1250	武蔵配送センター 0978-68-1123
国東配送センター 0978-72-1340	安岐配送センター 0978-67-1315
杵築配送センター 0978-63-4417	山香グリーン店 0977-75-0470

大分県東部振興局 0978-72-1141

◎農薬飛散防止対策として、安全な粒剤体系で実施しよう!
◎品質の向上と安定多収は土づくり肥料の投入から
◎米は全量農協へ