

プロモート林設置箇所一覧

No.	旧町村	気候条件(2023年観測値)					地質条件		平均 傾斜	類似箇所	選定理由
		区分	年降水量	最低気温	最高気温	標高	地質	類型			
1	安岐町	瀬戸内	1486	-5.0	34.4	207	玄武岩質安山岩	火山堆積物	25	杵築市・太田村・山香町・武蔵町 安心院町・院内町・本耶馬溪町・耶馬溪町の一部	岩の出現が多く土の粒子が粗めで水通りが良い 他所と降水量、降雪の多寡による差異を確認できる
2	挾間町	瀬戸内	1566	-3.9	35.5	290	流紋岩 (デイサイト)	火山堆積物	20	日出町・安心院町・院内町・別府市・湯布院町の一部	緩傾斜と急傾斜の境界が明瞭で、土壌の粒子が粗く 若干の粘土化が進み乾燥傾向、ヒノキ地に近い
3	湯布院町 (大字川上)	九州山地	2105	-9.7	33.1	673	玄武岩質安山岩	火山堆積物	10	湯布院町の一部、庄内町の大部分	表面は厚い火山灰の堆積がある黒ボク土で、重厚な 巨岩を内在、水分過多で寒冷地
4	湯布院町 (大字川西)	九州山地	2105	-9.7	33.1	763	内陸性堆積岩	堆積岩	20	地質は異なるが九重火山群の影響を受けている久住町・直入町・ 九重町・湯布院町の一部は同様の土質	厚い火山灰の堆積がある黒ボク土で、3の地域より高 地である寒冷地
5	本匠村	南海	1815	-3.7	36.2	334	海洋性堆積岩 (秩父帯)	堆積岩	35	津久見市、臼杵市・野津町・三重町・清川村・緒方町の一部	泥岩を主体として石灰岩を産出することが多いエリア、 急傾斜を形成するが水通りが良くスギの植栽が多い
6	宇目町	南海	2316	-7.1	35.9	200	海洋性堆積岩 (四万十帯)	堆積岩	40	佐伯市、上浦町、直川村、宇目町、鶴見町、米水津村、蒲江町、弥生 町・本匠村の一部	砂岩と泥岩が互層で出現し、急傾斜ができやすい 水通りが良くスギの植栽が多い
7	蒲江町	南海	2098	-2.7	34.9	32	海洋性堆積岩 (四万十帯)	堆積岩	30	6と同様	6と同様の地質ではあるが、山間部と海岸付近の違い がある
8	大野町	瀬戸内	1516	-6.7	36.8	268	玄武岩質安山岩	火山堆積物	20	大野町・朝地町の一部	緩傾斜と急傾斜の境界が明瞭で、土壌の粒子が粗く 若干の粘土化が進み乾燥傾向、ヒノキ地に近い
9	緒方町	九州山地	1725	-6.5	35.5	360	流紋岩 (デイサイト)	火山堆積物	5	豊肥地域の太宗を占める	阿蘇第4期火砕流であり、緩傾斜と急傾斜が明瞭に 別れ、表土は厚い黒ボク土に覆われている 当該地は、傾斜10度未満の緩傾斜である
10	荻町	九州山地	1725	-6.5	35.5	602	流紋岩 (デイサイト)	火山堆積物	35	豊肥地域の太宗を占める	阿蘇第4期火砕流であり、緩傾斜と急傾斜が明瞭に 別れ、表土は厚い黒ボク土に覆われている 当該地は、傾斜30度以上の急傾斜である
11	直入町	九州山地	1725	-6.5	35.5	571	流紋岩 (デイサイト)	火山堆積物	20	旧直入町・旧野津原町の大部分	庄内火山群の火砕流であり、緩傾斜と急傾斜が明瞭 に別れ、表土は厚い黒ボク土に覆われている 当該地は、傾斜20度程度の傾斜である
12	玖珠町 (大字小田)	九州山地	2037	-9.9	35.7	903	玄武岩質安山岩	火山堆積物	10	玖珠町・九重町の一部、旧天瀬町の大部分	万年山火山群の火砕流の影響を受けており、緩傾斜 が多く厚く黒ボク土が堆積し、水通りは良くない
13	玖珠町 (大字古後)	九州山地	2037	-9.9	35.7	315	流紋岩 (デイサイト)	火山堆積物	5	玖珠町・日田市・天瀬町・耶馬溪町・本耶馬溪町・院内町・湯布院 町・庄内町の一部	耶馬溪由布川火砕流で巨大な岩石の露出がある地 質であり、風化物と火山灰が混在する
14	天瀬町	九州山地	2078	-5.3	37.6	364	流紋岩 (デイサイト)	火山堆積物	15	玖珠町・九重町の一部、旧天瀬町の大部分	万年山火山群の火砕流の影響を受けており、緩傾斜 と急傾斜の境界が明瞭、埴壌土
15	上津江町	九州山地	2078	-5.3	37.6	216	玄武岩質安山岩	火山堆積物	20	日田市・前津江村・中津江村・上津江村の一部	緩傾斜と急傾斜の境界が明瞭で、土壌の粒子が粗く 若干の粘土化が進むが、火山灰土層が深い
16	耶馬溪町	九州山地	2117	-6.5	35.7	545	玄武岩質安山岩	火山堆積物	20	三光村・本耶馬溪町・耶馬溪町・山国町の一部	緩傾斜と急傾斜の境界が明瞭で、礫を含み土壌粒子 のバランスは良いが、粘土化が進むところもある
17	院内町	九州山地	1733	-6.5	35.7	411	玄武岩質安山岩	火山堆積物	30	日出町、杵築市・安心院町・院内町・別府市・湯布院町の一部	緩傾斜と急傾斜の境界が明瞭で、土壌の粒子が粗く 若干の粘土化が進み乾燥傾向、ヒノキ地に近い
18	豊後高田市	瀬戸内	1557	-5.4	36.0	470	玄武岩質安山岩	火山堆積物	20	豊後高田市、真玉町、香々地町、国見町、国東町 三光村・宇佐市の一部	岩の出現が多く土の粒子が粗めで水通りが良い 他所と降水量、降雪の多寡による差異を確認できる