

緊急赤潮情報 4

令和8年8月13日
大分県農林水産研究指導センター水産研究部

入津湾でシャットネラ類(有害プランクトン)が注意密度、ヘテロシグマ・アカシオ(有害プランクトン)が警戒密度を超えています。
魚介類の管理にご注意下さい。

発生場所	入津湾	
プランクトン種類	シャットネラ類	
	河内湾奥	24 細胞/ml(表層)
	河内湾HAIセンサー前	8 細胞/ml(表層)
	ヘテロシグマ・アカシオ	
	河内湾奥	63,100 細胞/ml(表層)
発生期間	令和8年8月13日～	

(シャットネラ属の注意点)


- ・警戒密度：100cells/ml 注意密度：10cells/ml
- ・シャットネラ属は魚介類に斃死を引き起こす有害な赤潮プランクトンです。
- ・海面が着色する前の低密度（100 細胞/ml）で斃死させます。
- ・パッチ状になった赤潮は潮流や風の影響で移動し養殖、蓄養中の魚介類に被害をおよぼすことがあります。
- ・陸上養殖では夜間に、中層での赤潮を引き込む危険があります。

(ヘテロシグマ・アカシオの注意点)

- ・警戒密度：50,000 細胞/ml 注意密度：5,000細胞/ml
- ・ヘテロシグマ・アカシオは魚介類に斃死を及ぼす有害な赤潮プランクトンです。特にシマアジに有害です。
- ・鉛直運動するため午前中に海色がよくても、午後から着色し被害を発生することがあります。
- ・パッチ状になった赤潮は潮流や風の影響で移動し養殖、蓄養中の魚介類に被害をおよぼすことがあります。

赤潮発生場所での対応

- ・投餌は控える。
- ・赤潮海域へ魚介類を入れない。
- ・赤潮海域から魚介類を避難する。
- ・蓄養は控える。



河内HAIセンサー前
シャットネラ属
8 細胞/ml (表層)

河内湾奥（着色あり）
シャットネラ属
24 細胞/ml (表層)
ヘテロシグマ・アカシオ
63,100 細胞/ml (表層)