

緊急赤潮情報 5

令和8年9月8日
大分県農林水産研究指導センター水産研究部

佐伯湾で有害プランクトン（シャットネラ類）が分布域を拡大し、注意密度を超えています。ご注意ください。

発生場所	佐伯湾
発生期間	9月8日～
プランクトン	シャットネラ類
	霞ヶ浦
	（表層） 46 cells/mL
	（2m層） 4 cells/mL
	鶴見ポンツーン
	（表層） 10 cells/mL
	（2m層） 6 cells/mL

（シャットネラ属の注意点）

- ・警戒密度：100cells/ml 注意密度：10cells/ml
- ・シャットネラ属は魚介類に斃死を引き起こす有害な赤潮プランクトンです。
- ・海面が着色する前の低密度（100 細胞/ml）で斃死させます。
- ・パッチ状になった赤潮は潮流や風の影響で移動し養殖、蓄養中の魚介類に被害をおよぼすことがあります。
- ・陸上養殖では夜間に、中層での赤潮を引き込む危険があります。

赤潮発生場所での対応

- ・投餌は控える。
- ・赤潮海域へ魚介類を入れない。
- ・赤潮海域から魚介類を避難する。
- ・蓄養は控える。

霞ヶ浦
46 cells/ml(表層)
4 cells/ml(2m層)

鶴見ポンツーン
10 cells/ml(表層)
6 cells/ml(2m層)

