




収穫直前、収穫時期と水管理は適切に！

品種ごとの収穫適期表

品種	積算温度 (°C)	青粳率 (%)
コシヒカリ	850	20
ひとめぼれ	900	20
つや姫	1,000	15~20
なつほのか	1,050~1,150	10~15
ヒノヒカリ	950	20~25
にこまる	1,050~1,100	20

【収穫適期の穂のようす】




※積算温度：出穂期以降の日平均気温を積算した温度

早刈りの場合

- ・未熟粒が増加し、収量低下
- ・貯蔵時の虫害の発生増加

遅刈りの場合

- ・乳白米、胴割れ米の増加
- ・倒伏の増加



水管理のポイント（登熟～収穫）

- ・**間断灌水**を**収穫1週間前**まで行う。
- ・**落水が早い**と、乳白米・胴割米の増加や収量低下につながるため注意する。

斑点米カメムシ類・トビイロウンカに注意！

- ・斑点米カメムシ類（8/4）、トビイロウンカ（8/15）について注意報が出されています。
- ・圃場を確認し、防除を徹底しましょう！

台風 ※台風通過中は水路や圃場へは絶対行かないでください！ 影響

- ・茎葉の損傷、粳ずれや登熟不良、倒伏等による収量低下。
- ・通過後のフェーン現象による高温乾燥で不稔による収量低下。

対策

- ・強風が予想されるときは直ちに**5cm以上の深水湛水**を実施する。
- ・通過後は、汚濁水を排除し、**新しい水と入れ替える**。

