
白ねぎ便り（11月号）

1. 九州北部地域の気象予報

1か月予報　10/17～11/16　福岡管区気象台10/22発表
気温：**高い**　降水量：**多い**　日照時間：**少ない**
3か月予報　10～12月　福岡管区気象台10/20発表
気温：**高い**　降水量：**多い**

2. シロイチモジヨトウについて（トラップ誘殺数）

・誘殺数が８月並みに増えていますが、気温の低下から一時的なものだと考えられます。
・11月中旬ごろまでは被害が発生する恐れがあるので、引き続き、ほ場の観察および適切な防除をお願いします。※**10月26日に注意報が発表されています。**



3. 葉枯病

・春～初夏に発生が見られた圃場近辺ではご注意ください。
・気温が25℃以下になり、降雨が続くと発生しやすくなります。
・べと病等の病斑やアザミウマの食害痕等から侵入する場合があります。。

FRAC	農薬名	使用時期	使用方法	使用回数
M5	**ダコニール1000**	収穫14日前	散布	3回
3 M3	**テーク水和剤**	収穫14日前	散布	3回
11	**アミスター20フロアブル**	収穫3日前	散布	4回
7	**アフェットフロアブル**	収穫前日	散布	2回
	カナメフロアブル	収穫前日	散布	4回

4. べと病

・気温が低下しはじめ、べと病が発生しやすい気象になってきました。
・降雨等により**ねぎが乾かない時間**が長いと感染が始まります。
・発病前に**予防効果の高いマンゼブ**(RAC：M3)を含む農薬で防除を行い、ローテーション散布をお願いします。

FRAC	農薬名	使用時期	使用方法	使用回数
3 M3	**テークワ水和剤**	収穫14日前	散布	3回
4 11	**ユニフォーム粒剤**	土寄せ時 収穫45日前	株元土壌 混和	1回
4 M3	**リドミルゴールドMZ**	収穫14日前	散布	3回
11	**メジャーフロアブル**	収穫前日	散布	3回
21	**ランマンフロアブル**	収穫3日前	散布	4回
21 27	**ダイナモ顆粒水和剤**	収穫3日前	散布	4回
27 40	**ベトファイター顆粒水和剤**	収穫14日前	散布	3回
40	**レーバスフロアブル**	収穫7日前	散布	2回
40 M3	**カンパネラ水和剤**	収穫14日前	散布	3回
40 M5	**プロポーズ顆粒水和剤**	収穫14日前	散布	3回

※赤字はマンゼブを含む農薬

農薬の効果・浸透移行性はメーカーHP等を参考に記入しています。同じ成分を含んでいる農薬があるので総使用回数の確認をお願いします。使用方法等により「濃度・使用量」等が異なりますので使用前にラベルを確認ください。

問い合わせ先　(2026.10.28発行)
北部振興局生産流通部(0978-28-2337)
園芸第1班（宇佐市）大保
園芸第2班（豊後高田市）姫野・安部